

# Vendimia 2021. Primer informe de campaña

22 de julio de 2021

<b>Resumen</b> .....	<b>1</b>
<b>Metodología</b> .....	<b>1</b>
<b>DOP JEREZ-XÉRÈS-SHERRY Y MANZANILLA</b> .....	<b>1</b>
<b>DOP MONTILLA MORILES</b> .....	<b>2</b>
<b>DOP CONDADO DE HUELVA</b> .....	<b>3</b>
<b>DOP MALAGA Y SIERRAS DE MÁLAGA</b> .....	<b>4</b>
<b>DOP GRANADA</b> .....	<b>5</b>
<b>VC LEBRIJA</b> .....	<b>5</b>

## Resumen

El estado en general del viñedo es bueno-muy bueno. La benigna meteorología primaveral ha favorecido a las cepas y al desarrollo de las bayas. Si durante el verano no ocurre ninguna incidencia meteorológica, se espera una producción normal y con buena calidad.

Pocas incidencias sanitarias y bien controladas.

## Metodología

Para realizar este informe se ha contactado a lo largo de las semanas 28-29 con los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas y Vinos de Calidad, con el objeto de obtener una impresión preliminar de cómo se presenta la vendimia 2021 y la incidencia que en la misma haya podido tener la meteorología.

## DOP JEREZ-XÉRÈS-SHERRY Y MANZANILLA

### Calendario

Según los controles de maduración de campo que analizan parámetros de grado y acidez, el estado de la uva es similar al del año pasado por estas fechas, aunque con un adelanto de 10-12 días respecto a la fecha normal. Con ello se espera que la vendimia se inicie, en la mayoría de los pagos interiores del Marco, en torno a la primera semana de agosto, mientras los pagos más costeros entrarán más tarde en campaña.

En la última semana de julio se cortarán las variedades de uva blanca empleadas en los vinos de la Tierra de Cádiz (Chardonnay y Sauvignon blanc), adelantándose también a las fechas habituales.

Pero todo dependerá de la evolución de las temperaturas en las próximas dos semanas.

### **Incidencias durante el cultivo y estado sanitario.**

Al contrario que en años anteriores, durante el otoño y el invierno se han producido precipitaciones, con más abundancia que otros años, y la primavera ha sido más seca. En invierno se han registrado algunos periodos de temperatura muy fría que ha favorecido la hibernación de las yemas y la acumulación de horas de frío necesaria para su brotación.

En general el estado sanitario es bueno.

La COCHINILLA ALGODONOSA es la plaga que está teniendo más incidencia. Estos insectos de la familia de los homópteros se caracterizan por pasar el invierno bajo la corteza del tronco de la vid, para salir en primavera-verano. Genera una melaza que van desprendiendo y que atrae hongos como la negrilla.

Esta plaga está favoreciendo la proliferación de la CRIPTOBABLE que es una polilla que nunca ha tenido mucha incidencia en la zona, pero que ya el año pasado hizo daño y este año está apareciendo en la zona costera y algunos pagos del interior. Es una polilla menos dañina que la LOBESIA, ya que no perfora la uva, pero aprovecha las roturas para penetrar en ella.

El OIDIO está teniendo condiciones favorables y se han realizado algunos tratamientos para controlarlo, con lo que está teniendo una incidencia baja.

Como la primavera ha sido bastante seca, no se ha detectado la presencia de MILDIU en muchas zonas.

Sí se ha detectado el MOSQUITO VERDE, aunque no existen daños reseñables. Las viñas jóvenes, más tiernas, suelen ser las más afectadas, siendo el momento más delicado tras la recolección del Girasol, ya que el mosquito que se concentra en este cultivo pasará al viñedo.

### **Producción**

Los agricultores estiman una producción similar a la del año pasado o algo más corta, ya que el conteo del número de racimos es ligeramente inferior al del pasado año. Se espera, por tanto, que sea de nuevo una cosecha corta, pero de buena calidad.

Si durante las próximas semanas no continuasen las noches frescas actuales y se produjese una incidencia del cálido viento de levante, la cosecha podría descender hasta un 10-15% por debajo de la del año pasado.

### **Bodegas**

La comercialización de vino de Jerez en 2020-21 no ha sido demasiado mala, a pesar de la cancelación de ferias y eventos, ya que, con la aplicación del Brexit, se incrementaron las exportaciones a UK. Además, la escasa cosecha del pasado año ha propiciado que no haya grandes volúmenes remanentes en bodegas y cooperativas.

## **DOP MONTILLA MORILES**

### **Calendario**

La maduración de las vides se encuentra 7-10 días atrasada respecto al año pasado, recuperando así el calendario habitual.

La recolección de las variedades más tempranas (Chardonay, Sauvignon Blanc, Verdejo y Moscatel) dará comienzo a finales de julio, seguida de las variedades tintas. Será a mediados o

finales de agosto cuando se iniciará la vendimia de la variedad más característica (Pedro Ximénez).

#### **Incidencias durante el cultivo y estado sanitario.**

Los viñedos cordobeses se encuentran, en general, en buen estado sanitario y con un desarrollo vegetativo apropiado a pesar del estrés acumulado de 3 años con escasa pluviometría.

Apenas se han detectado plagas o enfermedades, principalmente MILDIU y OIDIO, pero su localización temprana y la meteorología benévola ha permitido el control adecuado de las mismas. Ha habido incidencia de la tercera generación de la polilla del racimo (Lobesia Botrana) en la zona de la sierra de Montilla, las heridas producidas por las polillas son vías de entrada por la que penetran las esporas de los hongos causantes de las podredumbres, de ahí la importancia del control de la polilla en estas generaciones.

Las temperaturas hasta ahora han permitido una óptima evolución de la uva y del proceso madurativo. Se espera obtener una uva sana y de calidad, aunque las últimas semanas de julio serán determinantes en el desarrollo de la cosecha.

#### **Producción**

Se espera una cosecha más corta que la del 2020, con resultados desiguales según la zona. Las explotaciones de Montilla o Aguilar tendrán un descenso de producción en torno al 15%, mientras que en zonas de Montemayor quizás se alcance el 25-30% de descenso. Pero en todo ello será determinante la meteorología de las próximas semanas.

#### **Bodegas**

En los últimos meses se han incrementado las ventas a nivel nacional e internacional de los vinos envasados de Montilla-Moriles. Se nota una cierta recuperación del consumo en la hostelería, aunque no al ritmo deseado. Por el contrario, los graneles no terminan de levantar cabeza tras las pérdidas sufridas por la pandemia. Todavía hay volúmenes importantes de vino almacenados, lo que está dando lugar a una caída significativa en los niveles de precios, situándose por debajo del umbral de rentabilidad de algunas entidades.

Como consecuencia, hay un cierto desánimo entre los viticultores y temor a una bajada del precio de la uva, máxime cuando este cultivo es muy exigente e intensivo en mano de obra.

## **DOP CONDADO DE HUELVA**

#### **Calendario**

La recolección de las variedades minoritarias y más tempranas se iniciará en la última semana de julio, mientras que en la segunda quincena de agosto se iniciará la recolección de la uva mayoritaria (Zalema).

#### **Incidencias durante el cultivo y estado sanitario.**

La meteorología desde el otoño (con temperaturas benévolas, y no demasiado seca) ha permitido una cierta recuperación de las vides. Las bayas se están desarrollando adecuadamente en unos racimos sanos y compactos, aunque en menor número que en la campaña pasada.

Al contrario que el pasado año, los controles y tratamientos han evitado la incidencia de plagas y enfermedades, encontrando una uva muy sana y de buena calidad.

## Producción

Por el efecto aún del Mildiu del pasado año ha descendido el número de racimos cuajados, por lo que se espera una producción en torno a un 15% inferior a la de un año normal, y aun así, se duplicará la cosechada el año pasado.

## Bodegas.

En una denominación donde el 85% de la producción se comercializa a granel, el movimiento de las bodegas, y hasta los precios, dependen más de las condiciones externas que de los volúmenes cosechados. En un entorno donde aún no se ha recuperado la normalidad, hay cierto desánimo entre bodegas y viticultores.

## DOP MALAGA Y SIERRAS DE MÁLAGA

### Calendario

Se estima que el inicio de la vendimia será en las fechas habituales. Es decir, dará comienzo los últimos días de julio con la uva blanca Moscatel de Alejandría de la Axarquía. La recolección de las uvas tintas se iniciará algunos días después, sobre el 8, 9 o 10 de agosto en la zona de Mollina.

### Incidencias durante el cultivo y estado sanitario.

Desde septiembre de 2020 las precipitaciones han sido un 25 % menores a la media histórica, aunque, puntualmente, los registros de los meses de enero y, especialmente, abril - momentos propicios para el ciclo de la vid- han sido superiores al histórico. Los registros medios de temperatura desde marzo (inicio del ciclo anual vegetativo de la vid), prácticamente concuerdan con los históricos, habiendo sido ligeramente cálidos en primavera, aunque descendiendo algo por debajo de la media en junio.

El desarrollo vegetativo inicialmente apuntaba a un retraso de 15-20 días respecto al año pasado, aunque éste ya estuvo adelantado. Sin embargo, las temperaturas cálidas y las lluvias de primavera han supuesto una normalización en el desarrollo del cultivo.

No se han producido alertas importantes respecto a la incidencia de plagas o enfermedades habituales en la zona (mildiu, oidio, araña amarilla, eriosis y mosquito verde) debido al control contante que se realiza para cumplir los criterios de lucha integrada. La vid se encuentra con un buen estado fitosanitario y un desarrollo vegetativo apropiado.

### Producción

Se estima que la producción será un 10% inferior a la del pasado año, ya que la escasez de precipitaciones es recurrente en el último lustro. Se podría cuantificar la campaña en torno a los 3,7 millones de kg de uva, con una buena-muy buena calidad organoléptica y de graduación alcohólica potencial.

### Bodegas

La demanda de vino, muy dependiente de la actividad turística, no termina de arrancar tras el parón ocasionado por la pandemia. Siguen estando muy afectadas las bodegas de pequeño y mediano tamaño.

## DOP GRANADA

### Calendario

La maduración de las bayas presenta algo de retraso, ya que el frío primaveral retrasó una semana la floración. Pero si el verano es normal, las altas temperaturas acelerarán la maduración y la vendimia se desarrollará en las fechas habituales. Por tanto, se espera que ésta se inicie a mitad de agosto con la cosecha de las variedades blancas, mientras las tintas se recolectarán desde principios de septiembre hasta finales de octubre.

### Incidencias durante el cultivo y estado sanitario

Las vides presentan un buen desarrollo. No ha llovido suficiente para cubrir el déficit hídrico del suelo tras los últimos años de sequía, pero sí para permitir un óptimo desarrollo vegetativo.

Con la humedad que hubo en primavera se temió una proliferación de MILDIU, por lo que se han realizado tratamientos con azufre que han evitado las enfermedades fúngicas. Aunque en algunas variedades sensibles (Cabernet, Moscatel de Alejandría, etc.) se ha detectado un poco de OIDIO.

En general la calidad sanitaria es buena- muy buena.

### Producción

Al contrario que el año pasado, se espera una cosecha media normal tanto en blancas como en tintas. Los racimos tienen buen tamaño y el cuaje ha sido bueno. En algunas zonas de las Alpujarras y zonas de sierra, incluso puede que la producción sea superior a la media.

### Bodegas

Poco a poco se va incrementando el consumo, pero la recuperación es muy lenta debido a que la actividad turística todavía no alcanza los niveles normales. La comercialización está aún por debajo del 50% de un año normal.

## VC LEBRIJA

A falta de un mes para que empiece la vendimia, los pagos lebrijanos presentan una carga media de uva, que auguran una producción dentro de lo normal si las condiciones atmosféricas estivales son normales.

La meteorología hasta ahora ha sido benévola y el desarrollo no ha tenido complicaciones. Algunas presencias de mildiu, araña y mosquito han sido fácilmente controladas.

La comercialización está aún recuperándose. Depende de la hostelería y el consumo sigue un 40% por debajo de lo habitual en estas fechas.